

Ukázka modelových otázek – odborné testy (Intenzivní péče)

1. Při intoxikaci CO vzniká

- a. zvýšená hladina karboxyhemoglobinu
- b. zvýšené hladiny redukovaného hemoglobinu
- c. zvýšená hladina karboxylhemoglobinu
- d. methemoglobinemie

2. Mezi hemodynamické monitorování patří sledování parametrů:

- a. pulzní oxymetrie
- b. srdeční výdej
- c. EKG
- d. kapnometrie

3. Při umělé plicní ventilaci bude na rozdíl od spontánní ventilace centrální žilní tlak

- a. vyšší
- b. nižší
- c. do 24 hodin od zahájení umělé plicní ventilace dojde k vyrovnání hodnot
- d. hodnota tlaku není závislá na typu ventilace

4. Novoseven je:

- a. rekombinantní koagulační faktor VIIa
- b. rekombinantní koagulační faktor VIIIa
- c. koncentrát koagulačních faktorů
- d. směs trombocytů

5. Optimální velikost tlaku v obturační manžetě endotracheální kanyly je

- a. 15 - 20 mmHg
- b. 20 - 35 mmHg
- c. 18 - 25 mmHg
- d. 10 - 15 mmHg

6. Tvorba erythropoetinu při hypoxemii

- a. stoupá
- b. klesá
- c. se nemění
- d. v závislosti na funkci ledvin klesá

7. Při předávkování opiáty je antidotem

- a. naloxon
- b. flumazenil
- c. fysostygmín
- d. N-acetylcystein

8. Uveďte velikost energie, kterou použijete pro defibrilaci bifázickým defibrilátorem

- a. 200J
- b. 350J
- c. 400J
- d. 150J

9. Nozokomiální infekce je infekce jejíž první známky se u pacienta vyskytly

- a. za 24 hod po přijetí k hospitalizaci
- b. za 48 hod po přijetí k hospitalizaci
- c. ihned po přijetí k hospitalizaci
- d. 5. den hospitalizace

10. U pacientů s astma bronchiale je pro úvod do anestezie

- a. vhodné použít Thiopental, inhalační anestetika, myorelaxancia
- b. vhodné použít inhalační anestetika, Thiopental
- c. nevhodné použít myorelaxancia
- d. nevhodné použít Thiopental