

Císlo otázky	Znění otázky	odpověď a	odpověď b	odpověď c
1	Modré zbarvení oblohy je způsobeno:	Rayleighovým (molekulárním) rozptylem	aerosolovým rozptylem (difuzní odraz)	koeficientem extinkce záření
2	Stadiál je:	relativně teplejší období glaciálu	relativně chladnější období glaciálu	relativně teplejší období interglaciálu
3	Hranice období trvání malých vodností řek (suché období) je stanovena dosažením:	Q355	Q20	Q5
4	Závislost mezi vodním stavem a průtokem pro daný měrný profil se nazývá:	hydromodul	měrná křivka průtoků (konsumpční křivka)	hydraulický poloměr
5	Marinní sedimenty vznikají v prostředí:	řek	moří	jezerních pánví
6	Thufur je:	kopečkovitá forma s minerálním jádrem vzniklá v periglaciální zóně za spolupůsobení vegetace	depresní forma vzniklá v tropické zóně rozpouštěním usazených hornin	zarovnaný povrch vzniklý deflací v aridní zóně
7	Lateritizace (feralitizace) je intenzivní zvětrávání obohacující půdu o jíl:	v mírném podnebí	v subtropickém podnebí	v ekvatoriálním podnebí
8	Křovákovo zobrazení je vhodné pro zobrazení:	celého světa	jedné polokoule	lokálního území protáhlého tvaru
9	Jak se lišilo klima Arabského poloostrova a Sahary v první polovině holocénu od současnosti?	vlhčí klima spojené se silnějším monzunem v důsledku teplejšího podnebí první poloviny holocénu	výrazně chladnější klima v důsledku doznívání glaciálu	srovnatelné se současností, klima je v průběhu holocénu relativně stabilní
10	Morfometrická analýza reliéfu slouží mimo jiné ke stanovení:	způsobu vzniku forem reliéfu	stáří vzniku forem reliéfu	rozměrů forem reliéfu